

Rò hậu môn là gì? Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị và cách phòng ngừa rò hậu môn

Rò hậu môn là 1 đường hầm bé xuất hiện giữa đoạn cuối của ruột cùng với vùng da sắp lỗ hậu môn. Lý do thường là do nhiễm khuẩn gần hậu môn, gây nên tụ mủ (áp xe) tại mô gần đấy. Bệnh rò hậu môn có khả năng dẫn đến các biểu hiện ví dụ không dễ chịu cùng với kích ứng da, luôn sẽ ko tự thuyên giảm. Trị bằng giải phẫu được yêu cầu trong hầu hết những tình huống.

Nghiên cứu tổng quát rãnh nứt và lỗ rò hậu môn, trực tràng

Bệnh rò hậu môn là một đường thông nối khác thường hình thành từ bên trong lỗ đít đi xuất da bên bên cạnh. Nó thường sinh ra tại phần phía trên của lỗ đít, khu sở hữu tuyến hậu môn. Thời điểm những tuyến này mắc phải nhiễm trùng, dịch thoát xuất có thể xuất hiện lỗ rò.

Dấu hiệu khe nứt cũng như lỗ bệnh rò hậu môn, trực tràng

Những biểu hiện cũng như triệu chứng của rò hậu môn

Các biểu hiện bệnh mạch lươn thường gặp đặc biệt :

Cảm giác đau hậu môn, thường đau buốt và dữ dội. Bạn có thể cảm giác đau phổ biến hơn thời gian ho, đi ngoài hoặc ngồi. Mông có thể mẫn cảm thời điểm mắc phải sờ tới.

- Sung cũng như đỏ bên trong hay bên cạnh hậu môn. Đây là biểu hiện của nhiễm trùng đang hoạt động dưới da (nhiễm trùng mô tế bào).
- Dịch chảy ra quanh đó lỗ đít của bạn. Nó có khả năng bao gồm phân, dịch mủ hay huyết. Có khả năng kèm theo mùi không dễ chịu.

Những biểu hiện khác hiếm gặp hơn gồm có :

Sốt;

- Cảm giác đau lúc đi tiểu;
- Đi tiêu ko kiểm chế (són phân).

Bạn có thể (hoặc không thể) nhìn thấy lỗ rò với gương.

Đau lỗ đít nhiều lúc đi ngoài có khả năng là triệu chứng của rò hậu môn

Biến chứng có khả năng bắt gặp thời gian bị bệnh mạch lươn

Bệnh rò hậu môn luôn sẽ không tự khỏi. Trường hợp dùng nên trị, bệnh mạch lươn có thể gây ra những nguy hiểm, ví dụ :

[đa khoa thái hà](#)

[phòng khám đa khoa thái hà có tốt không](#)

[chi phí chữa bệnh giang mai](#)

[khám bệnh giang mai](#)

[xét nghiệm rpr là gì](#)

[xét nghiệm rpr ở đâu Hà Nội](#)

Nhiễm trùng dai dẳng : đường rò bắt nguồn từ áp xe hoặc nhiễm trùng có thể khiến nhiễm trùng tiếp tục hoạt động. Nhiễm khuẩn đường ví dụ mất đi ở vị trí trước tiên nhưng sau đó quay trở lại, hình thành áp xe mới và dẫn đến cơn cảm giác đau mới. Lắm khi, lỗ rò có vẻ ví dụ đang khỏi lại cùng với có thể đóng lại, nhưng mà nhiễm khuẩn sẽ tái phát cùng với đường rò dần dần sẽ mở lại định kỳ lặp lại.

- Mở rộng lỗ rò : lỗ rò mãn tính ít khi mở rộng theo phương mới, gây nên những kênh phân nhánh và lỗ hở mới trên kia da của bạn. Những lỗ rò khó khăn này khó chữa hơn.
- Ung thư : Ung thư hậu môn lắm lúc được nhận thấy ở những vết bệnh rò hậu môn đã từng tồn tại trong nhiều năm. Nhiễm trùng mạn tính và xói mòn là các nguyên do nguy cơ gây ung thư.

Thời gian nào bắt buộc bắt gặp chuyên gia ?

Liên tục đến bắt gặp bác sỹ giả dụ bạn bị cảm giác đau lỗ đít. Đau đớn đa dạng tại vùng hậu môn có thể là 1 hiện tượng nặng. Đừng giúp rằng triệu chứng sẽ tự mất. Lòi dom có khả năng phổ biến và quen thuộc hơn tuy nhiên chúng thường ko gây đau đớn phổ biến.

Nguyên do khe nứt và lỗ bệnh mạch lươn, trực tràng

Nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh mạch lươn là áp xe quanh lỗ đít, thường sinh ra trên tuyến lỗ đít mắc phải nhiễm khuẩn. Áp xe là một túi mũ xuất hiện ở khu nhiễm trùng. Mủ cần được thoát xuất cùng với có khả năng tạo thành rò chảy bên không tính. Nguyên do ít gặp của bệnh rò hậu môn gồm có :

Bệnh lý viêm nhiễm đường ruột (bệnh Crohn);

- Bệnh lý lao;
- 1 chấn thương vì đụng đập hoặc do phẫu thuật;
- Dị vật khu vực lỗ đít cũng như tăng sinh môn;
- Xạ trị ở khu vực chậu;
- Ung thư hậu môn trực tràng;
- Nấm actinomycosis;
- Hidradenitis suppurativa, một bệnh lý viêm da mạn tính gây ra áp xe tại tuyến hậu môn.

Bệnh lý Crohn có thể là nguyên nhân của bệnh mạch lươn

Khả năng rãnh nứt và lỗ bệnh mạch lươn, trực tràng

Người nào có khả năng mắc bệnh rò hậu môn ?

Bệnh rò hậu môn là một bệnh lý hậu môn trực tràng hơi thường gặp. Nó thường gặp ở cánh mày râu, gấp đôi phụ nữ. Chừng khoảng 1 nửa số người mắc phải nhiễm khuẩn tuyến hậu môn sẽ phát triển thành lỗ rò. Tuyến mắc phải nhiễm khuẩn tạo thành áp xe, túi mũ phải được cặp lưu, gây ra 75% trường hợp rò hậu môn.

Lý do làm tăng nguy cơ mắc phải rò hậu môn

Bạn mang đa dạng xác suất bị bệnh rò hậu môn nếu bạn :

Giới đặc tính nam;

- Đã từng hay đã từng bị áp xe quanh lỗ đít trước đây;
- Mắc bệnh viêm nhiễm ruột mạn chẳng hạn thí dụ bệnh lý Crohn;
- Sở hữu tiền căn phẫu thuật hay xạ chữa ở khu vực quanh hậu môn;
- Bị giảm sút miễn dịch;
- Nhiễm phải lan truyền qua giao hợp mạn tính.

Cách chẩn đoán và chữa trị khe nứt và lỗ rò hậu môn, trực tràng

Phương pháp kết luận cùng với thăm khám rò hậu môn

Để chẩn đoán bạn sở hữu bị bệnh rò hậu môn hoặc không, y bác sĩ sẽ hỏi về tiền căn, bệnh lý sử của bạn cũng như thăm khám.

Một số đường rò cực kỳ dễ nhận biết, tuy nhiên không phải thời gian nào cũng vậy. Lầm lúc đường rò tự đóng, dần dần mở lại. Y bác sĩ sẽ tìm triệu chứng chảy dịch hay ra huyết. Chuyên gia có thể sử dụng ngón tay để khám hậu môn của bạn.

Một số cận lâm sàng có khả năng được yêu cầu đó là chụp X-quang hay chụp CT scan. Bạn đặc biệt có khả năng buộc phải được nội soi.

Điều trị bệnh rò hậu môn

Bệnh rò hậu môn luôn cần giải phẫu do chúng hiếm khi tự khỏi nếu dùng nên chữa trị.

Những cách điều trị rò hậu môn bằng mổ, gồm có :

Mở đàng rò;

- Mổ đường rò;
- Cột dây thun;
- Đổi thành vạt niêm mạc trực tràng;
- Mổ đàng rò gian cơ thắt.

Phẫu thuật trong điều trị rò hậu môn

Những cách trị bệnh rò hậu môn mới :

Bơm keo sinh học có fibrin;

- Tế bào gốc từ mỡ tự thân.

Toàn bộ những cách điều trị đều có tiện lợi cùng với rủi ro không giống nhau. Bạn có thể chia sẻ Việc đó sở hữu chuyên gia của mình.

Chế độ dinh dưỡng và ngăn ngừa khe nứt và lỗ bệnh rò hậu môn, trực tràng

Những thói quen sống có khả năng giúp bạn làm giảm diễn tiến của bệnh rò hậu môn

Chế độ dinh dưỡng :

Dùng thuốc giảm sút đau đớn thời gian nên thiết;

- Ngâm nước ấm;
- Giảm thiểu rặn lúc đi đại tiện.

Chế độ ăn uống : Thêm chất xơ đến chế độ sinh hoạt cùng với uống phổ biến nước để phòng ngừa táo bón.

Người bệnh bệnh mạch lươn nên cung cấp chất xơ tới chế độ dinh dưỡng

Phòng ngừa rò hậu môn

Sau đây là một vài cách ngăn chặn bệnh rò hậu môn mà bạn có khả năng áp dụng :

Trị viêm nhiễm : một số trường hợp bệnh rò hậu môn có khả năng xuất phát từ 1 viêm nhiễm trong vùng hậu môn. Để hạn chế tình hình này, bạn bắt buộc chăm sóc khu vực lỗ đít cùng với sử dụng các cách vệ sinh cá nhân phù hợp.

- Giảm thiểu đại tiện khó : táo bón có khả năng gây ra sức ép cùng với lo lắng trong vùng lỗ đít, từ đây tạo điều kiện giúp sự lớn mạnh của rò hậu môn. Để giảm thiểu táo bón, hãy ăn một khẩu phần ăn chứa nhiều chất xơ, uống đầy đủ nước cũng như duy trì một lịch trình đi vệ sinh thường xuyên.
- Giảm thiểu rặn thời điểm đi vệ sinh : Rặn lúc đi ngoài có thể dẫn tới tổn thương giúp niêm mạc hậu môn và hỗ trợ lên việc tạo thành rò hậu môn. Hãy đảm bảo bạn đại tiện theo bí quyết từ từ, ko rặn quá nhiều cũng như tránh ép buộc trong lúc này.
- Chữa những bệnh lý mối quan hệ : một số bệnh lý không giống đó là nứt hậu môn hay nhiễm trùng ruột kết hợp có thể tạo cơ hội cho quá trình lớn mạnh của bệnh mạch lươn. Trường hợp bạn có những thắc mắc này, hãy điều trị chúng sớm để tránh tình hình vươn lên là nghiêm trọng hơn.
- Điều trị sớm những nhiễm khuẩn lỗ đít : ví như bạn với các dấu hiệu của nhiễm trùng lỗ đít thí dụ đau, sưng, hay xuất mủ, hãy chữa trị ngay lập tức. Việc chữa trị sớm có thể cho phòng tránh quá trình lan rộng của nhiễm khuẩn cũng như giảm sút nguy cơ lớn mạnh bệnh mạch lươn.
- Xét nghiệm sức khỏe thường xuyên : định kỳ thăm khám tính mệnh mang bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa có khả năng cho nhận biết sớm bất cứ vấn đề nào sự liên quan tới lỗ đít cùng với chữa chúng sớm.

Hạn chế đại tiện khó để ngăn chặn bệnh rò hậu môn

Những quan tâm thường gặp về rò hậu môn

Các rủi ro của phẫu thuật rò hậu môn là như nào ?

Các rủi ro chính là :

Nhiễm trùng tái phát : giả dụ nhiễm trùng ko mất đi triệt để khỏi đường rò của bạn, nó có khả năng tồn ở ở trong đường rò đang khỏi của bạn.

- Đường rò tái nhiễm : Lỗ bệnh rò hậu môn có thể tái nhiễm dưới giải phẫu. Điều này có thể là vì các bệnh mạn tính tiềm ẩn hoặc vì khoa học được sử dụng.
- Đi cầu ko kiểm chế : một vài đối tượng có thể gặp phải tình trạng này. Thí dụ, họ có khả năng bắt gặp phức tạp trong vấn đề duy trì khí hoặc són phân.

Quá trình hồi phục dưới phẫu thuật bệnh rò hậu môn như thế nào ?

Dưới giải phẫu, bạn sẽ được kê thuốc giảm sút cảm giác đau cùng với một số hướng dẫn cách tự chăm sóc. Những Điều đó có khả năng bao gồm :

Bổ sung nước cũng như chất xơ : Thuốc suy giảm đau đốn có khả năng gây ra đại tiện khó, vì vậy y bác sĩ có khả năng kê đơn thuốc để ngăn ngừa Việc đó. Điều quan trọng là nên cùng với vấn đề dùng phổ biến nước.

- Ngâm lỗ đít : Ngâm lỗ đít trong nước ấm ít nhất 1 lần hàng ngày sẽ giúp khiến cho dịu và nhanh lành chỗ bị thương.
- Khắc phục vết thương : Bạn có thể cần thiết thay thế băng vùng da bị thương thường xuyên để giữ gìn sạch.

Quá trình khác biệt giữa nứt hậu môn cũng như lỗ bệnh rò hậu môn là sao ?

Nứt hậu môn là vết nứt hay vết rách ở niêm mạc ống lỗ đít của bạn. Nó có khả năng gây ra các dấu hiệu giống với rò hậu môn, tuy nhiên vết nứt là 1 vùng da bị thương bề ngoài. Nó không xuyên qua thành hậu môn tới da của bạn giống như đường rò. Mặc dù vậy, bệnh nứt kẽ hậu môn có thể phát triển thành lỗ rò hậu môn. Nếu vết bệnh nứt hậu môn mắc phải nhiễm trùng, nó có thể sinh ra áp xe cũng như gây nên lỗ bệnh rò hậu môn.

Em cần mong muốn điều gì trường hợp cháu mắc phải bệnh mạch lươn ?

Tiên lượng của bạn sẽ tùy thuộc vào mức độ khó khăn của lỗ rò hậu môn. Điều đó ý muốn công đoạn điều trị và khôi phục sẽ cải thiện thế nào. Nhắc chung, bạn có thể nên mất từ ba đến sáu tuần để hồi phục dưới 1 hay nhiều lần phẫu thuật. Một số lỗ rò tái phát dưới tiểu phẫu, đặc biệt giả dụ chúng mang nhiều nhánh hay do bệnh lý mãn tính dẫn đến.

Rò hậu môn âm đạo là sao ?

Rò hậu môn cô bé luôn được gọi là rò trực tràng âm hộ, vì nó thường thông nối từ trực tràng đến âm hộ. Ranh giới giữa trực tràng cùng với cô bé hẹp hơn đa dạng so với giữa cô bé cũng như lỗ đít. Đường rò cô bé có thể tạo thành từ bất cứ phần nào của ruột, song luôn là từ trực tràng hay đại tràng.